

# Pflanzenschutz Wintergetreide

Frühjahr 2022

LRA-LWA Biberach Tel. 07351/526711

Herbizid	Aufwandmenge [g,l,kg / ha]	HRAC-Code	zugelassen in					Ungräser	Unkräuter	Einsatz EC	Kosten [€/ha]	Gewässerabstand (Standard/50%/75%/90%) /Sonst.
			WG	WW	WR	T	D					
Atlantis Flex + FHS	270-330g + 0,8 - 1,0l	2		x		x		Afu, Wh, Wg, Fh	(Schwäche: Unkräuter)	21 - 29 (32)	57-71	5/5,5,5 m; NW 701, NW 800; <b>hoher Besatz od. schwer bekämpfbarer Afu/Tr.;</b> <b>AHL/SSA zur Wirkungsverbesserung zugeben</b>
Atlantis Flex <sup>1)</sup> + FHS + Biathlon 4D + Dash	200 g + 0,6 l + 70 g + 1 l	2		x	x	x	x	Afu/Wh/j.Ri	breite Mischverunkr.	21 - 29 (32)	76	5/5,5,5 m; NW 800
Atlantis Flex + FHS + Artus + Primus Perfect	200 g + 0,6 l + 30 g + 0,15 l	2,4,14		x	x	x		Afu/Wh/j.Ri	breite Mischver.	21 - 29 (32)	85	5/5,5,5 m; NW 800
Attribut + Saracen + Artus	100 g + 0,05 l + 30 g	2,14		x	x*	x*		(Afu)/Wh/j.Ri	breite Mischverunkr.	12 - 25 (29)	85	5/5,5,5 m; (* = max 60 g Attribut); Bodenfeuchte bei der Applikation wichtig; kein Winterraps und keine zweikeimblättrigen Zwischenfrüchte nachbauen
Axial 50	1,2 l	1	x	x	x	x	x	Afu, Wh, Wg, Fh	-	13 - 29 (39)	60	5 m; bei starkem Ungrasbesatz Netzmittel verwenden (z.B. 1,0 l/ha Dash)
Axial 50 <sup>2)</sup> + Ariane C	1,2 l + 1,0	1,2,4	x	x	x	x	x	Afu, Wh, Wg, Fh	breite Mischverunkr. (Schwäche: Ehrenpreis, Stiefm.)	13 - 29 (39)	97	5 m
Axial 50 <sup>2)</sup> + Alliance + Saracen	1,2 l + 0,08 l + 0,05 l	1,2,12	x	x	x	x		Afu, Wh, Wg, Fh	breite Mischverunkr.	13 - 29	92	nz./15,5,5 m; NW 701
Broadway + FHS	220 g + 1,0 l	2		x	x	x	x	(Afu), (j. Ri), Wg, Fh	breite Mischverunkr. (Schwäche bei Taubn.)	12 - 25 (30)	69	5 m; Wh 130 g+0,6 l FHS; evtl. AHL/SSA zur Wirkungsverbesserung zugeben
Broadway + FHS + Pixxaro EC	220 g + 1,0 l + 0,25 l	2,4		x	x	x	x	Afu, j.. Ri, Wg, Fh	breite Mischverunkr.	12 - 25 (30)	84	10/5,5,5 m; NW 706
Niantic + Probe + Pointer Plus	0,4 l + 0,8 l + 40g	2		x				Afu, j.. Ri, Wg, Fh	breite Mischverunkr.	13 - 30 (32)	85	5m, NW 800
Traxos <sup>2)</sup> + Zypar	1,2 l + 1,0 l	1,2,4		x	x	x		Afu, Wh, Wg, Fh	breite Mischverunkr.	13 - 29 (30)	91	10/5,5,5 m; NW 706
Husar Plus + Mero	0,2 l + 1,0 l	2		x	x	x	x	Wh, (j. Ri, Wg)	Mischverunkr.	13 - 31	46	5/5,5,5 m; NW 800; NT 108

<sup>1)</sup> Sortenverträglichkeit Dinkel beachten

<sup>2)</sup> bei starkem Besatz Ungras- und Unkrautbehandlung trennen (Spritzfolge), Ungras (Afu) zuerst

Abstandsauflagen und Legende siehe zweite Seite

**Resistenzrisiko: Accase-Hemmer = WSSA-Gruppe 1 = sehr hoch ; ALS-Hemmer = WSSA-Gruppe 2 = hoch;**

# Pflanzenschutz Sommergetreide

Frühjahr 2022

LRA-LWA Biberach Tel. 07351/526711

Herbizid	Aufwandmenge [g,l/kg / ha]	HRAC-Code	zugelassen in				Ungräser	Unkräuter	Einsatz EC	Kosten [€/ha]	Gewässerabstand (Standard/50%/75%/90%) /Sonst.
			SG	SW	H	SDu					
Axial 50 + Zypar	0,9 l - 1,2 l + 0,75 l	1,2,4	x	x		x	Afu, Wh, Wg, Fh	breite Mischverunkr.	13 - 39	71 - 86	20/10,5,5 m
Axial Komplett	1,0 l	1,2	x	x		x	Afu/Wh/Wg, Fh	Mischverunkr. (Schwäche: Ehrenp., Taubn, Stiefm.)	13 - 39	47	5 m
Husar Plus + Mero	0,15 l + 0,75 l	2	x	x		x	Wh (j.Ri, Wg)	Mischverunkr.	13 - 39	34	5/5,5,5m NW 800; NT 108
Concert SX + Ariane C	100 g + 0,75 l	2,4	x	x	x		(Wh)	breite Mischverunkr.	13 - 29	60	5/5,5,5 m NW 701; NW 800; NT 108
Artus + Saracen	40 g + 0,05 l	2,14	x	x	x		-	breite Mischverunkr.	13 - 29	36	5/5,5,5 m; in Hafer nur bis EC 25 <b>auch bei kühleren Bedingungen möglich</b>
Biathlon 4D + Dash	70 g + 1 l	2	x	x	x	x	-	Mischverunkr.	13 - 39	34	5 m <b>Gänsefuß, Distel, Ackerwinde, Ampfer</b>
Duplosan Super	2,5 l	4	x	x	x	x	-	Mischverunkr. (Schwäche: Kamil., Stiefm.)	10 - 30	44	5/5,5,5 m NG 403, NT 109; <b>warme wüchsige Witterung</b>
Omnera LQM	0,8 - 1,0 l	2,4	x	x			-	breite Mischverunkr.	12 - 39	29 - 37	15/10,5,5; NW 701, NW 800
Pointer Plus	50 g	2	x	x	x		-	breite Mischverunkr.	13 - 39	32	5/5,5,5m NT 108

## Reguläre Behandlungen und mögliche Spätbehandlungen gegen Problemunkräuter

Ariane C	1,5 l	2,4	Wi.- u. So.getreide	-	breite Mischverunkr.	13-39 / 13-30	55	5 m <b>Distel, Kamille, Klette, Kornblume</b>
Pixxaro EC	0,25 l - 0,5 l	4	Wi.- u. So.getreide	-	Mischverunkr.	13 - 45	15 - 29	10/5,5,5 m; nicht in Hafer NW 706; <b>Erdrach, Klette,Knöterich Arten, Storchschn.Arten</b>
Pointer SX	35 g	2	Wintergetreide	-	Distel, Mischverunkr.	30 - 39	19	5 m <b>Distel, (Ampfer)</b>
Starane XL	1,0 l - 1,5 l	2,4	Wi.- u. So.getreide	-	breite Mischverunkr.	13-45 / 13-29	25 - 37	10/5,5,5 m <b>Hohlzahn, Klatschm., Klette, Kornbl, Winden</b>
Tomigan 200	0,75 l - 0,9 l	4	Wi.- u. So.getreide	-	Klette, Mischverunkr.	13-39/13-45	19 - 23	5 m NT 108; <b>(Ampfer), Klette, (Winden)</b>
U 46 M-Fluid (MCPA)	1,4 l	4	Wi.- u. So.getreide	-	Distel, Mischverunkr.	32 - 39	14	5 m NT 109; <b>Ampfer, Distel, Winden (warm., wüchsiges Wetter)</b>
Zypar	1,0 l	2,4	Wi.- u. So.getreide	-	Mischverunkr.	13 - 45	35	10/5,5,5 m NW 706; <b>Erdrach, Klette,Storchschn.Arten</b>

Legende: Afu=Ackerfuchsschw., Wh=Windhalm, Wg=Weidelgr., Fh=Flughafner, j..Ri.=einjährige Rispe; Einsatz EC: Werte in Klammer = max. Einsatzzeitpunkt; nz = nicht zulässig

NT 108 (20 m Breite zu terr. Strukturen mit 75 % Düse) bzw. NT 109 (analog mit 90 % Düse) spritzen

NG 405 = keine Anwendung auf drainierten Flächen / NG 403 und NW 800 = keine Anwendung auf drainierten Flächen zw. 1.Nov. & 15.März;

NW 705 u. NG 412 (5 m); NW 701 u. NG 402 (10 m); NG 409 (10 bzw. 20 m); NW 706 u. NG 404 (20 m) = bei > 2 % Hangneigung bewachsener Randstreifen mit entsprechender Breite (.... m) nötig, bei Mulch- bzw. Direktsaat od. wenn entspr. Auffangsysteme für abgeschwemmtes Wasser od. Boden vorhanden sind, muss dieser nicht vorhanden sein;

NG 314 = keine Anwendung zw. 1. Sept. und 1. März; NG 315 = keine Anwendung vor dem 15. April; NG 410 = keine Anwendung auf Böden mit Tongehalt > 30 %; 408 = keine Anwendung auf drainierten Flächen zw. 1. Juni und 1.März  
NG 411/414 = keine Anwendung auf "sandigen" Böden;

Preise inkl. Rabatt und MwSt., Stand 2021

**Pauschalabstand zu Gewässern in BW = 5 m**