

Herbizid	Aufwandmenge [g,l,kg / ha]	HRAC-Code	Einsatzzeitpunkt	Kosten [€/ha]	Wirkung über	Einsatz / Hinweise
Adengo	0,33l	2, 27	VA - 3 Blattstadium	45	Boden und Blatt	Bodenfeuchte nötig; kein Einsatz auf sehr humosen oder humusarmen Standorten
Quantum + IP Pendi 400 SC	1,5l + 2,0l	3, 15	VA	77	Boden	Bodenfeuchte nötig
Spectrum Aqua Pack Spectrum + Stomp Aqua	1,25l + 2,5l	3, 15	VA - 10 Tage nach der Saat	81	Boden	Bodenfeuchte nötig / Hirsensandorte inkl. Storchschnabel
Activus SC + Arigo + FHS	2,5l + 0,3kg + 0,3l	3, 2, 27	2 - 4 Blattst.	70	Blatt und Boden	breit wirksam, alle Hirsenarten und Quecke
Elumis P Dual Pack Elumis + Peak + Dual Gold	1,25l + 20g + 1,25l	2, 27, 15	2 - 8 Blattst.	83	Blatt und Boden	inkl. Ehrenpreis, Hirsen, Knöteriche, Nachtschatten
Laudis + Spectrum	2,0l + 1,0l	15, 27	2 - 6 Blattst.	95	Blatt und Boden	spez. gegen Hirsen und Unkräuter, gute Verträglichkeit
MaisTer power	1,5l	2	3 - 6 Blattst.	69	Blatt und Boden	Ungräser und Unkräuter
MaisTer power + Spectrum	1,25l + 1,0l	2, 15	3 - 6 Blattst.	86	Blatt und Boden	Hirsensandorte
Botiga + Nicogan	1,0l + 1,0l	6, 27	2 - 8 Blattst.	65	Blatt	Unkräuter, Hirsen, Ungräser
Diniro + Adigor	0,4kg + 1,2l	2, 4	2 - 8 Blattst.	45	überwiegend Blatt	Unkräuter und Ungräser
Elumis Peak Pack Elumis + Peak	1,25l + 20g	2, 27	2 - 7 Blattst.	61	überwiegend Blatt	inkl. Ehrenpreis und Nachtschatten
Samson 4SC + Arrat + Dash E.C.	1,0l + 0,2kg + 1,0l	2, 4	2 - 4 Blattst.	43	rein Blatt	inkl. Winden, Disteln, Ampfer, Quecke
Task + FHS + Callisto	0,3kg + 0,25l + 0,8l	2, 4, 27	2 - 4 Blattst.	87	überwiegend Blatt	Nebenwirkung gegen Ampfer, Winde, Distel
Zingis + Mero	0,29l + 2,0l	2, 27	2 - 6 Blattst.	74	überwiegend Blatt	Mischverunkrautung
Arrat + Dash	0,2kg + 1,0l	2, 4	6 - 10 Blattst.	26	Blatt	breite Spätverunkrautung inkl. Ampfer, Winden, Disteln
Effigo	0,35l	4	2 - 8 Blattst.	49	Blatt	Distelarten (10-20cm hoch), Nachtschatten, Franzosenkraut wüchsiges Wetter
Mais Banvel WG	0,35 - 0,5kg	4	6 - 8 Blattst.	24 - 35	Blatt	spez. Windenarten (10-15cm lang), Tage+Nächte warm

Zumischung  
eines  
Boden-  
herbizids  
möglich /  
je nach  
Verun-  
krautung  
(z.B. mit  
Hirsens)  
sinnvoll

Treten Hirsen oder Storchschnabel verstärkt auf, kann es sinnvoll sein, eine Spritzfolge zu fahren: z.B. Adengo im VA (Bodenfeuchte!), Elumis P Pack / Laudis / Maister Power im NA. Bei trockenen Bedingungen blattaktives Herbizid zuerst, Bondeherbizid zum 2. Termin. Bei guten Bedingungen kann auch eine der beiden Spritzungen durch eine mechanische Maßnahme (Blindstriegeln, Hacken) ersetzt werden.

Verträglichkeit (u. U. sortenabhängig), Wachsschicht beachten.

Preis: inkl. Rabatt inkl. MWSt.; Gebrauchsanleitung vor Einsatz unbedingt beachten