

Herbizideinsatz in Raps - Gräser, Ausfallgetreide, Problemunkräuter

08/2021

Unkraut/Ungras- besatz	Mittel	Aufwandmengen l/ha				HRAC - Code	Kosten € incl. MwSt.	Anwendung	Sonstiges / Gewässerabstand etc.
		Gerste Flughäfer Afu/Wh	Weizen Roggen Triticale	Trespe Weidelgras	Quecke				
nur Ungräser/Ausfallgetreide	Fusilade Max	0,7	0,75	1,0	2,0	1 / Fop	22 - 63	blattaktiv, Anwendung ab 3 Blattst. Getreide / Ungras; warme wüchsige Witterung fördert die Wirkung	
	Targa Super	0,75	0,75	1,25	2,0	1 / Fop	14 - 38		
	Gram Fix	0,75	0,75	1,25	2,0	1 / Fop	14 - 36		
	Panarex	1,0	1,25	1,25	2,0-2,25	1 / Fop	21 - 48		
	Agil-S	0,7	0,75	1,0		1 / Fop	23 - 33		
Mittel zur Resistenzvorbeugung bei Ungräsern	Focus Ultra + Dash	1,0 + 1,0	1,0 + 1,0	1,5 + 1,5	2,0 + 2,0	1 / Dim	31 - 61		
	Select 240 (+ Öl)	0,5 + 1,0	0,5 + 1,0	0,5 + 1,0		1 / Dim	34		incl.einj. Rispe; 30/15,10,5 m; Zul. in Raps nur im Herbst
	Crawler ¹⁾	3 kg/ha				23	42		incl. resist. Biotypen; NG 359
zusätzl. Vogelmiere (Ehrenpreis)	Kerb Flo	1,25 - 1,875 (bei Afu)				3	31 - 46	bodenaktiv, spät auflaufende Ungräser; Anwendung ab 4 Blattst. Raps; Spätherbst bis Winter (dauerhaft < 5°C); feuchter Boden von Vorteil, auch auf gefrorenem aber schneefreiem Boden möglich	gegen incl. einj. Rispe, incl. resist. Biotypen
zusätzl. Kamille, Ehrenpreis, Trespen, Klatschmohn, Kornblume, Vogelmiere	Milestone	1,5				3,4	31		incl. einj. Rispe, incl. resist. Biotypen
Mittel gegen zweikeimblättrige Unkräuter im Nachauflauf									
Kamille, Kornblume, Distelarten, Kreuzkraut, Nachtschatten, Ausfallleguminosen	Effigo	0,35				4	49		ab 2-Bl.St. Raps-Ende Okt./Frühjahr ab Veg.Beg. bis max. BBC
Kamille, Distelarten, Klatschmohn, Kreuzkraut, Windknöterich, Kornblume, Ausfallleguminosen,	Runway	0,2				4	31		NA Herbst/ NG 347, NG 348
Stiefmütterchen, Ehrenpreisarten, Erdrach, Raukearten, Hirtentäschel, Windknöterich, Ackerkrummhals, Ochsenzunge	Fox	1,0 im Splitting 0,3/0,7				14	33		4- und 6-Blattst. Raps, kein Einsatz auf nassen Beständen, keine Tankmischungen; 5/0,0,0 m; NW 701
Kamille, klatschmohn, Klette, Kornblume, Storchschnabel u.a.	Korvetto	1,0				4	46		NA Frühjahr; 5/5,5,0 m

Bis auf Korvetto und Fox (und Select bei abweichendem Additiv) haben die anderen Mittel keine Abstandsauflagen zu Gewässern,

jedoch ist in Baden-Württemberg ein Pauschalabstand von 5 m (Wassergesetz) einzuhalten.

¹⁾ Abverkaufsfrist 26.06.2021; Aufbrauchsfrist 26.12.2022

NW 701 = bei > 2 % Hangneigung zu Gewässer muss ein bewachsener Randstreifen mit 10 m Breite vorhanden sein, bei Mulch- und Direktsaat entfällt diese Auflage.

NG 345 = Auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff **Haloxypop-P (Haloxypop-R)** im folgenden Kalenderjahr

NG 347 = Auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff **Aminopyralid** in den beiden folgenden Kalenderjahren

NG 348 = Auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff **Clopyralid** in den beiden folgenden Kalenderjahren

NG 359 = Innerhalb von zwei Jahren dürfen maximal 1800 g/ha **Carbetamid** auf derselben Fläche ausgebracht werden.

NG 405 = Keine Anwendung auf drainierten Flächen; Preise Pflanzenschutzmittelkosten incl. MwSt. von 2021



Landwirtschaftsamt
Sachgebiet Pflanzenbau
07351-52/6711