

## Winter- /Zottelwicke (*Vicia vilosa*)

Familie	Hülsenfrüchtler ( <i>Leguminosae</i> )
Reinsaatstärke (kg/ha)	60
Kosten netto (€/kg) <sup>2)</sup>	3,20 <sup>2)</sup>
TKM (g)	60
Jugendentwicklung <sup>3)</sup>	sehr schwach
Konkurrenzstärke <sup>3)</sup>	sehr schwach
Unkrautunterdrückung <sup>3)</sup>	schwach
Späteste Aussaat (pflanzenbauliche Empfehlung) <sup>3)</sup>	Mitte August
Mulchauflage im Frühjahr <sup>3)</sup>	sehr hoch (winterhart)
Bienen <sup>3+4)</sup>	Nektar: gut; Pollen: gut
Durchwurzelungsvermögen/Wurzelform	stark verzweigt, Tiefenwurzler
Ansprüche an Boden und Klima	pH-Wert > 6 förderlich; ideal: feuchtwarmer Herbst, trockenes Frühjahr; Sandböden oder auch schwerere Böden
Winterhärte	winterhart
Geeignete Folgefrüchte	Mais, Getreide, keine Leguminosen
Risiken/Nachteile/Krankheiten/Besonderheiten	"Leguminosenmüdigkeit" Stickstoffsammler → gute Vorfruchtwirkung, Bienenweide, guter Bodenaufschluss, gute Bodenbedeckung, da in späteren Entwicklungsstadien massenwüchsig, trocken tolerant

<sup>1)</sup> Quelle: Schlathöler, M. und P.H. Petersen, P.H.: Welche Art was mitbringt. DLG-Mitteilung 6/2015 S. 54 - 57

<sup>2)</sup> Entsprechen speziellen Sorten der Arten unserer Anfrage vom Juli 2015 bei einer Bestellmenge von <500 kg. Bitte fragen Sie beim Landhandel bzw. Saatgutfirmen an!

<sup>3)</sup> Die Angaben können in Abhängigkeit von Sorten, Standort und Saatzeitpunkt variieren.

<sup>4)</sup> Bienenweidekatalog Baden-Württemberg



