

Fungizideinsatz in Weizen - Frühjahr 2023

LRA-LWA Biberach Tel.: 07351/526711

Fungizid	Aufwandmenge [g,l,kg / ha]	Wirkstoffgruppen nach FRAC	Einsatz EC	Kosten [€/ha]	Gewässerabstand (Standard/50%/75%/90%) /Hinweise
Einmalbehandlung i.d.R. Stad. 47 - 51 weite Fruchtfolgen/ krankheitsresistente Sorten / mittlere Intensitäten etc.					
Ascra Xpro	1,5 l	Azol, SDHI	39 - 55	95	10/5,5,5* m; NW 701
Balaya + Folpan 500 SC	1,5 l + 1,5 l	Azol, Qol, Kontakt	39 - 55	101	10/5,5,5 m
Jordi	1,5 l	Azol, SDHI, G2	39 - 55	85	k.A./20,15,10 m; NW 706
Revytrex	1,5 l	Azol, SDHI	39 - 55	76	5/5,5,5* m
Revytrex + Comet	1,5 l + 0,5 l	Azol, SDHI, Qol	39 - 55	88	15/10,5,5* m
Skyway Xpro	1,25 l	Azol, SDHI	39 - 55	88	10/5,5,5* m; NW 706
Univog	2,0 l	Azol, Qil	39 - 55	87	k.A./15,10,5 m; NW 706
Doppelbehandlung intensiverAnbau / probl. Fruchtfolgen / intensiver Gülleeinsatz etc.					
Revystar + Flexity	1,0 l + 0,5 l	Azol, B6	31 - 32	136	5/5,5,5* m
Ascra Xpro	1,2 l	Azol, SDHI	47 - 55		
Input Triple	1,0 l	Azol, G2, E1	31 - 32	133	k.A./15,15,10 m; NW 706
Univog	1,6 l	Azol, Qil	47 - 55		
Input Classic	0,8 l	Azol, G2	31 - 32	145	k.A./20,15,15 m; NW 706
Revytrex + Folpan 500 SC	1,5 l + 1,5 l	Azol, SDHI, Kontakt	47 - 55		
Balaya	1,0 l	Azol, Qol	31 - 32	121	10/5,5,5 m
Univog	1,6 l	Azol, Qil	47 - 55		
Ascra Xpro	1,2 l	Azol, SDHI	37 - 49	123	5/5,5,5* m
Magnello	1,0 l	Azol	59 - 65		
Fandango + Folpan 500 SC	1,2 l + 1,5 l	Azol, Strobi, Kontakt	37 - 49	178	5/5,5,5 m; NW 701
Univog	2,0 l	Azol, Qil	59 - 65		
Revytrex	1,5 l	Azol, SDHI	37 - 49	131	5/5,5*,5* m
Prosaro	1,0 l	Azol	59 - 65		
Revytrex + Comet	1,5 l + 0,5 l	Azol, SDHI, Qol	37 - 49	147	15/10,5,5 m
Proline	0,8 l	Azol, SDHI, Qol	59 - 65		
Univog	2,0 l	Azol, Qil	37 - 49	145	k.A./15,10,5 m; NW 706
Osiris MP	1,0 l + 0,5 l	Azol	59 - 65		

Legende: k.A. = keine Anwendung;

Azol = Azole; G2 = Morpholine, Piperidine, Spiroxamine; Kontakt = Kontaktwirkstoffe, SDHI = Carboxamide, Qol = Strobilurine, Qil=Qil-Hemmer (neue Wirkstoffgr.), E1 Quinazolinone
Um Resistenzen zu vermeiden ist eine Beschränkung der Strobilurin- und der Carboxamid-Präparate auf eine Anwendung in der Vegetation ratsam.

* Pauschalabstand zu Gewässern in BW = 5 m

NW 701 (10 m), NW 706 (20m) = bei > 2 % Hangneigung bewachsener Randstreifen von (.... m) nötig,gilt nicht bei Mulch-/Direktsaat od. wenn entspr.Auffangsysteme für abgeschwemmtes Wasser od. Boden vorhanden sind

Preis: inkl. Rabatt inkl. MWSt.