

Wachstumsregler in Getreide 2023

LRA-LWA Biberach

07351/526711

Anwendungsempfehlungen [l od. kg/ha] nach Kultur, Entwicklungsstadium, Mittel

Wachstumsregler	Wirkstoff [g/l]	Temperaturbereich	Wi-Weizen	Dinkel	Wi-Gerste inkl. Hybrid-Gerste	Triticale	Wi-Roggen	So-Weizen	So-Gerste	Hafer	Kosten inkl. MwSt.
CCC 720, Stabilan 720	720 g Chlormequat	tagsüber > 8°C nachts > 5°C	EC 23 - 31 0,3-0,5 ¹⁾ 0,6-1,2 ²⁾	-	-	EC 31-32 0,6 - 1,2	EC 30 - 32 1,0 - 1,5	EC 21 - 29 0,4 - 1,2	-	EC 37 - 39 1,0 - 2,0	5,60 €/l
Manipulator	620 g Chlormequat		EC 25 - 32 0,5 - 1,0	EC 25 - 31 0,5 - 1,0	EC 25 - 32 0,8 - 1,25	EC 31 - 32 0,6 - 1,2	-	EC 21 - 29 0,4 - 0,9	EC 30 - 35 0,8 - 1,1	EC 37 - 39 1,5 - 2,0	7 €/l
Calma	155,6 g Trienxapac	tagsüber > 10°C, bei bedecktem Wetter > 14°C	EC 31 - 32 0,3 - 0,4	-	EC 31 - 32 0,6 - 0,8	EC 31 - 39 0,4 - 0,6	EC 31 - 32 (39) 0,4 - 0,6	-	-	-	52,40 €/l
Countdown NT	222 g Trinexapac		EC 31 - 37 0,3 - 0,4	EC 31 - 32 0,3 - 0,4	EC 31 - 32 0,4-0,6 2-zeil. Sort. 0,6-0,8 4-zeil. Sort.	EC 31 - 39 0,3 - 0,6	EC 31 - 32 (39) 0,3 - 0,6	EC 31 - 37 0,3 - 0,4	EC 31 - 37 0,3 - 0,4	EC 32 - 37 0,3 - 0,4	46 €/l
Moddevo	222 g Trinexapac		EC 25 - 32 0,2 - 0,3	-	EC 29 - 32 0,3-0,4 2-zeil. Sort. 0,5-0,6 4-zeil. Sort.	EC 25 - 32 0,5	EC 25 - 32 0,5	EC 29 - 32 0,2 - 0,3	EC 29 - 32 0,4 - 0,6	-	54 €/l
Moddus	222 g Trinexapac		EC 31 - 37 0,3 - 0,45	EC 31 - 32 0,3 - 0,4	EC 31 - 37 0,3-0,5 2-zeil. Sort. 0,5-0,8 4-zeil. Sort.	EC 31 - 32 (39) 0,3 - 0,6	EC 31 - 39 0,4 - 0,6	-	EC 31 - 32 0,2 - 0,4	EC 32 - 37 0,4 - 0,2	67,30 €/l
Fabulis OD	46 g Prohexadion	ab 8°C	EC 31 - 37 0,8 - 1,0	-	EC 31 - 37 1,0 - 1,5	EC 31 - 37 0,8 - 1,0	-	EC 31 - 37 0,8 - 1,0	EC 30 - 37 0,5 - 0,8	-	23,50 €/l
Medax Top (+Turbo)	228 g Mepiquat 42 g Prohexadion	ab 8°C	EC 32 - 39 0,4 - 0,8 evtl. Splitting	-	EC 31 - 32 (37) 0,4-0,6* 2-zeil. Sort. 0,6-0,8* 4-zeil. Sort.	EC 31 - 37 0,5 - 1,0	EC 31 - 39 0,5 - 0,8	EC 30 - 39 0,4 - 0,7	EC 30 - 39 0,5 - 0,8	EC 31 - 32 0,4 - 0,8	20 €/l
Prodax	42 g Prohexadion 67 g Trinexapac	ab 8°C	EC 31 - 37 0,4 - 0,5	EC 31 - 32 0,4 - 0,5	EC 31 - 32 (39) 0,5 - 0,7	EC 31 - 32 (37) 0,3 - 0,5	EC 31 - 32 (37) 0,4 - 0,5	EC 31 - 39 0,3 - 0,4	EC 31 - 37 0,4 - 0,5	EC 31 - 32 (39) 0,4	51,20 €/l
Camposan Top	660 g Etephon	tagsüber > 15°C, nachts > 10 °C	EC 37 - 49 (51) 0,3 - 0,7	EC 37 - 49 0,3 - 0,5	EC 32 - 47 (49) 0,3 - 0,6	EC 37 - 49 0,5 - 0,75	EC 39 - 49 0,4 - 0,9	EC 37 - 49 (51) 0,5 - 0,7	EC 37 - 49 0,25 - 0,4	-	32 €/l
Cerone 660	660 g Etephon		EC 39 - 49 (51) 0,4 - 0,7	EC 37 - 49 0,4 - 0,7	EC 32 - 49 0,3 - 0,7	EC 37 - 49 0,3 - 0,5	EC 39 - 49 0,4 - 0,9	EC 37 - 49 0,4 - 0,7	EC 37 - 49 0,3 - 0,5	-	42,20 €/l

¹⁾ gute bis mittlere Standfestigkeit

²⁾ geringe Standfestigkeit

In Tankmischungen mit Azol-Fungiziden die Aufwandmengen der Wachstumsregler nach Herstellerangaben reduzieren.

Preise: inkl. Rabatt inkl. MwSt.

CCC/Stabilan 720/Manipulator:

Einsatz vor der Streckung EC 25-29, evtl. Nachkürzung EC 31-32, fördert Bestockung (Nebenriebe und deren Wurzelwerk), homogenere Bestände, Nebenriebe besser bekrönt, ab EC 31 in Kombination mit Moddus etc. empfohlen.

Calma/Countdown/Moddus:

idealer Einsatzzeitpunkt 31/32, intens. Sonneneinstrahlung > 8 Std. Sonne, bei bedecktem Wetter mind. 14°C, Vorsicht bei Temp. > 25°C
Kombinationen mit CCC möglich

Moddevo (vgl. Moddus Start):

Einsatz ab Mitte bis Ende Bestockung, aufgrund der Formulierung Einsatz auch bei tieferen Temperaturen möglich

Fabulis OD:

Prohexadion solo; Einsatz ab Temperaturen > 8°C

Medax Top:

Zu Medax Top immer die gleiche Menge Turbo zugeben! / Temperatur u. Wasserversorgung haben großen Einfluss auf den Wirkungsgrad:

je 20 % Reduktion der Aufwandmenge bei Temp > 25 °C im Einsatzzeitfenster, bei Trockenstress und knapper Wasserversorgung oder bei Mischungen mit Azolen oder Morpholinen / Zulassung auch in Emmer, Einkorn, Khorasan-Weizen, Gräser (Vermehrung) 1,0 l/ha und Rotklee (Vermehrung) 1,5 l/ha

Prodax:

In WW u. Triticale Kombination mit CCC in EC 30-32 möglich (Bsp.: 0,3 Prodax + 0,4-0,5 CCC in EC 31);

Kombination von zügigem Wirkungseintritt und Dauerwirkung; Zulassung auch in Emmer, Einkorn, Khorasan-Weizen

Camposan Extra/Cerone:

Während der Streckung einsetzen (ab EC 31/32, mind. 15°C beim Einsatz, keine Anwendung bei Wasserknappheit und Temp. > 25°C),

Wirkungsverstärkung durch Azole und Morpholine