

Herbizideinsatz in Wintergetreide Herbst 2024

Mittel / Mittelkombinationen		Aufwand- menge / ha	WSSA- Code	Anwendungs- zeitraum	Kultur	Kosten €/ha	Gewässerabstand, Auflagen, Abstand zu Saumkulturen	Anmerkungen, Sonstiges	
Windhalm- Standorte	Im Vorauf/ frühen Nachauf	Agolin + Cadou SC (Agolin Forte)	1,5 l + 0,24 l	3,12,15	VA - EC 13	WW, WG, WR, WT	34 kA/kA,kA,5 m Pendimethalin-Auflagen, NW 706, NW 800	Schwächen geg. Afu, Kamille, Kornbl.	
		Battle Delta + Beflex	0,3 l 0,3l	12,15	VA - EC 13	WW, WG, WR, WT	33,5 kA/kA,kA,10 m; NW 706 NT 101	Schwäche geg. Afu, Kornblume	
		Herold SC	0,4 l	12,15	VA - EC 13	WW, WG, WR, WT, Di	24 kA/15,10,5 m; NW 706 NT 102	Schwächen geg. Afu, Kamille, Klette, Kornbl.	
		Pontos	0,5 l	12,15	VA -EC 29	WW, WG, WR, WT	21 kA/10,5,5 m NT 102	Schwäche geg. Afu, Kornblume, Klette, Storchschnabel	
		Jura	4,0 l	3,5,12	VA - EC 11	WW, WG, WR, WT	39 kA/kA,kA,5 m NT146, NT170	NT145, Schwächen geg. Afu	
Ackerfuchschwanz- und Weidelgras-Standorte	Im Vorauf/ frühen Nachauf	Boxer + Cadou SC Pack	2,5 l + 0,5 l	15	VA - EC 12	WW, WG, WR	44 kA/kA,kA,5 m Prosulfocarb-Auflagen, NW 706, NW 800; NT 101	Schwächen geg. Kornbl., Klatschmohn	
		Herold SC	0,5 - 0,6 l	12,15	VA - EC 12	WW, WG, WR, WT, Di	30 - 36 kA/15,10,5 m; NW 706 102	NT in Triticale u. in Dinkel nur im NA mit 0,5l bzw. in Dinkel auf schweren Böden 0,6l ; Schwächen geg. Kamille, Klette, Kornbl.	
		Herold SC + Boxer	0,6 l 2,0 l	12,15	VA - EC 13	WW, WG, WR	52 kA/kA,kA,5 m Prosulfocarb-Auflagen, NW 706, NW 800; NT 102	Schwäche geg. Kornblume; besser verträglich bei ausreichend Saattiefe (3cm) und im VA	
		Herold SC + Lentipur 700*	0,5 - 0,6 l + 1,5 l	5,12,15	VA - EC 13	WW, WG, WT	54 - 57 kA/15,10,5 m; NW 706 NG 337, 405, 414 NT 102	Schwächen geg. Klette	
		Mateno Duo + Cadou SC (Mateno Forte bzw. Flexi Set)	0,7 l + 0,5 l	12,15, 32	VA	WW, WT	57	kA/kA,20,10 m; NW 706 NT 109	massiver Ackerfuchsschwanz Schwäche gegen Kornblume
			0,35 l + 0,5 l		VA - EC 13	WW, WG, WR, WT	44	kA/20,10,5 m NT 109	Afu normal Schwächen: Klette, Kornblumen, Storchschnabel
		Malibu	3,5 - 4,0 l	3,15	VA - EC 11 (13)	WW, WG, WR, WT	51 - 59 kA/kA,kA,5 m Pendimethalin-Auflagen, NW 701 NT 112	Schwäche gegen Kornblume	
	Quirinus + Pontos (Quirinus Forte Set)	0,5 l + 0,5 l	12,15	VA - EC 13	WW, WG, WR, WT	45 kA/10,5,5 m NT 102	Schwächen gegen Kornblume, Storchschnabel		
	Im Nachauf	Viper Compact	1,0 l	2,12	EC 10 - 23	WW, WG, WR, WT, Du	24 kA/kA/15,10 NT103	0,75 l Viper + 0,25 l Cadou SC: Wirkung gegen Afu	
		Herold SC + Traxos	0,5 l + 1,2 l	1,12,15	EC 12 - 29	WW, WR, WT	77 kA/5m, 5m, 5m, NT102	Starker Afu-Besatz, Bester Erfolg in Vegetationsruhe	
Carmina 640*		2,5 L	5,12	EC 10 - 29	WW, WG, WR, WT	40 10m, 5m, 5m, 5 m NG337, NG414, NT103	Positivliste der WW-Sorten beachten! (CTU) Ausdünnung in Roggen bei Einwaschung möglich		

* Chlortholuronverträglichkeit der Weizensorten beachten

Preise Pflanzenschutzmittel ohne MwSt. aus 2024

NW 800 = Keine Anwendung auf drainierten Flächen zwischen 1. November und 15. März.

NT 101/102/103 = 20 m Randbereich mit 50%/75%/90% Düse

Pendimethalin bzw. Prosulfocarb-Auflagen (NT 145, NT 146, NT 170): **mind. 5m Gewässerabstand in BW, unabhängig welche Düse!**


Anmerkungen:

Aus Resistenzgründen und der i.d.R. besseren Verträglichkeit sollte die Bekämpfung von Ungräser und Unkräutern in Wintergetreide im Herbst stattfinden (mind 14 Tage Wachstum verbleibend).

Hohe Wirkungsgrade der Bodenherbizide (VA bis früher NA, bis zum "Spitzen" der Kultur) auf feuchten, feinkrümeligen Böden (eventuell walzen)

Wenn Nachbehandlung nötig wird (z.B. starker Afu-Besatz, zu weit entwickelte Unkräuter), dann in Kombination mit blattaktiven Mitteln

Blattaktive Mittel ab EC 12 anwendbar, bis in die Vegetationsruhe, solange die Unkräuter noch sensitiv sind. (z.B. Traxos oder Axial 50 zur Afu-Bekämpfung, sogenannte Nikolausspritzung)



Landratsamt
Biberach

Landwirtschaftsamt
Sachgebiet Pflanzenbau
07351/52-6711