



Landratsamt
Biberach

Landwirtschaftsamt - Newsletter Pflanzenbau Warndienst Pflanzenschutz Nr. 1/2021

Amt: Landwirtschaftsamt
Thema: Pflanzenschutz Getreide/Raps/Mais/Leguminosen
Ansprechpartner: Stefanie Hotz
Tel. 07351 52-6711
Eingereicht am: 18.02.2021
Homepage: <https://www.landwirtschaftsamt-biberach.de>

Warndienst Pflanzenschutz Februar 2021

Nach einem Schneereichen Winter mit frostigen Temperaturen zum Ende hin scheint nun der Frühling anzuklopfen. Der Wetterbericht verkündet milde bis warme Temperaturen für die kommenden Tage, Niederschlag ist nicht zu erwarten.

Die Bestände kommen unversehrt unter der Schneedecke hervor. Die Böden konnten die Winterfeuchte optimal aufnehmen und werden in wenigen Tagen für pflanzenbauliche Maßnahmen befahrbar sein.

Winterraps:

Heute früh waren die Rapsbestände noch mit Reif besetzt.

Erkennbar war trotzdem, dass die Unkrautbekämpfungsmaßnahmen des Herbstes/ Winters die gewünschte Wirkung erzielt haben.

Mit steigenden Temperaturen gilt es allerdings wieder, die Schädlinge genauer im Blick zu haben. Stängelschädlinge beginnen ihre Flugaktivität bei 10°C, ein Monitoring mittels Gelbschale ist bereits ab 5 °C Bodentemperatur sinnvoll - also Gelbschalen aufstellen!

Denken Sie daran, die Gelbschale mit einem Gitter zu versehen, diese etwas ins Feld hinein zu platzieren und alle drei Tage zu kontrollieren.

Wintergetreide:

Auch die Wintergetreide im Landkreis kommen wunderbar entwickelt aus dem Winter. In vielen Beständen konnte bereits im Herbst die Unkrautregulierung vorgenommen werden und war vom Wirkungsgrad recht zufriedenstellend.

Auf Schlägen, auf denen Gräser doch nachbehandelt werden müssen und auf solchen, auf denen bisher noch gar keine Unkrautmaßnahme gesetzt wurde, ist es jetzt wichtig, früh zu agieren, um vor allem Gräser dann zu erreichen, wenn sie noch nicht sehr weit entwickelt sind. Die Pflanzenschutzmaßnahme sollte deshalb der Düngungsmaßnahme vorgezogen werden.

Optimaler Anwendungszeitpunkt ist innerhalb einer wüchsigen Phase bzw. in diese hinein. Die Nacht nach der Anwendung muss frostfrei sein, wenn es in den darauffolgenden Nächten wieder kühler ist, macht dies nichts aus.

Gräser-wirksame ACCase Hemmer (Axial 50, Traxos, Sword) können bereits vor Vegetationsbeginn bei niedrigen Temperaturen (4-6°C) eingesetzt werden. Die beste Wirkung zeigen diese Produkte im solo-Einsatz. Müssen zudem Unkräuter bekämpft werden, folgt dies als Spritzfolge mit mindestens einer Woche Abstand.

Sulfonylharnstoffe (u.a. Atlantis (Drainage-Auflage beachten), Broadway) können ebenfalls mit Vegetationsbeginn bei niedrigen Temperaturen (>8 - 10°C) und leichten Nachtfrösten (bis -3°C) eingesetzt werden.