

Clomazone-Auflagen in Raps 2019 (Kurzbeschreibung der Auflagen)

LRA-LWA Biberach 08/2019

NT127	<ul style="list-style-type: none">- Anwendung ausschließlich zwischen 18 Uhr abends und 9 Uhr morgens, wenn > 20°C vorhergesagt- keine Anwendung, wenn über 25°C vorhergesagt
NT145	<ul style="list-style-type: none">- Wasseraufwandmenge mind. 300 l, Düse: Abdriftminderungsklasse 90 %
NT146	<ul style="list-style-type: none">- Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung max. 7,5 km/h
NT149	<ul style="list-style-type: none">- Prüfung von Aufhellungen an Pflanzen im Umkreis von 100 m um die Behandlungsfläche, Zeitraum 1 Monat nach Anwendung, wöchentliche Beurteilung- wenn Aufhellungen vorhanden - Meldung an aml. Pflanzenschutzdienst
NT152	<ul style="list-style-type: none">- Flächenscharfer Anwendungsplan notwendig mit Saatzeitpunkt, geplantem und tatsächlichem Anwendungszeitpunkt, Aufwandmenge, Wassermenge und Details der Anwendungstechnik.- Plan ist während der Behandlung mitzuführen.
NT153	<ul style="list-style-type: none">- Information der Nachbarn, die der Abdrift ausgesetzt sein könnten, über geplante Anwendung (sofern diese eine Unterrichtung gefordert haben).
NT154	<ul style="list-style-type: none">- Abstand von 50 m zu Ortschaften, Haus- und Kleingärten, clomazonesensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Beerenobst), Flächen für biologische und diätetische Lebensmittelproduktion, Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind (Sportplätze, Parks etc.). Abstand von 50 m auf 20 m reduziert, wenn Mittel nicht in Tankmischung mit anderen PSM oder Zusatzstoffen ausgebracht.- Zu allen übrigen angrenzenden Flächen ist ein Abstand von mindestens 5 m einzuhalten (ausgenommen Flächen, die mit Winterraps, Getreide, Mais oder Zuckerrüben bestellt wurden, sowie bereits abgeerntete Fläche wie z.B. Stoppelfelder) <p>Mittel: Centium 36 CS, Clomazone 360 CS, Gamit 36 AMT</p>
NT155	<ul style="list-style-type: none">- Abstand von 50 m zu Ortschaften, Haus- und Kleingärten, clomazonesensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Beerenobst), Flächen für biologische und diätetische Lebensmittelproduktion, Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind (Sportplätze, Parks etc.)- Zu allen übrigen angrenzenden Flächen ist ein Abstand von mindestens 5 m einzuhalten (ausgenommen Flächen, die mit Winterraps, Getreide, Mais oder Zuckerrüben bestellt wurden, sowie bereits abgeerntete Flächen wie z.B. Stoppelfelder). <p>Mittel: Bengala, Clematis, Clomazone 360 CS, Colzor Trio, Colzor Sync Tec, Echelon, Lotus Clomazone, Nero, Nimbus CS</p>