Fungizideinsatz in Wintergerste (Sommergerste) Frühjahr 2020 LRA-LWA Biberach Tel.: 07351/526711

Fungizid	Aufwandmenge [g,l,kg / ha]	Einsatz EC	Kosten [€/ha]	Gewässerabstand (Standard/50%/75%/90%) /Hinweise
Einmalbehandlung			**weite Fruchtfolgen/ krankheitsresistente Sorten / mittlere Intensitäten etc.**	
Ascra Xpro + Amistar Opti *	1,2 l + 1,2 l	39 - 49/51	100	k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Adexar + Amistar Opti *	1,4 l + 1,4 l (1,2 l + 1,2 l)	39 - 49/51	95 (81)	k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Ceralo ** + Amistar Opti *	1,2 l + 1,5 l (1,0 l + 1,25l)	39 - 49/51	83 (69)	k.A./20,15,10 m; NW 706; NG 331
Elatus Era + Amistar Opti *	1,0 l + 1,5 l (0,8 l + 1,2 l)	39 - 49/51	101 (81)	k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Input Classic + Amistar Opti *	0,9 l + 1,5 l (0,75 l + 1,5 l)	39 - 49/51	82 (75)	k.A./20,15,15 m; NW 706; NG 331
Librax + Amistar Opti *	1,4 l + 1,4 l	39 - 49/51	92	k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Seguris + Amistar Opti *	1,0 l + 1,5 l (0,8 l + 1,2 l)	39 - 49/51	87 (70)	k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331, NG 342-1
Sommergerste nach 20.05.2020				
Ascra Xpro + Fandango	0,75 l + 0,75 l	49/51	83	10/5,5,0 m; NW 701
Input Classic + Torero + Orius	0,6 l + 0,5 l + 0,7 l	49/51	61	k.A./20,15,15 m; NW 706
Input Xpro	1,0 l	49/51	55	k.A./20,15,15 m; NW 706
Doppelbehandlung			**intensiverAnbau / probl. Fruchtfolgen / intensiver Gülleeinsatz etc.**	
Bontima Zakeo Opti *	1,5 l 2,0 l	32 - 39 45 - 55	100	15/10,5,5 m; NG 342-1 k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Ceralo ** Adexar + Amistar Opti *	1,0 l 1,4 l + 1,4 l	32 - 39 45 - 55	134	20/15,15,10; NW 706 k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Epoxion Top Porsaro + Amistar Opti *	2,0 l 0,8 l + 1,5 l	32 - 39 45 - 55	117	k.A./20,15,10 m; NW 706, NW 712 k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Epoxion Top Gigant + Amistar Opti *	2,0 l 1,0 l + 1,5 l	32 - 39 45 - 55	138	k.A./20,15,10 m; NW 706, NW 712 k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331, NG 342-1
Folicur Ascra Xpro + Amistar Opti *	1,25 l 1,0 l + 1,2 l	32 - 37 45 - 55	117	10/5,5,0 m; NW 701 k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Input Classic Ceriax + Amistar Opti *	0,8 l 1,2 l+ 1,2 l	32 - 39 45 - 55	114	k.A./20,15,15 m; NW 706 k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Input Classic Elatus Era + Amistar Opti *	0,8 l 0,8 l + 1,2 l	32 - 39 45 - 55	122	k.A./20,15,15 m; NW 706 k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331
Kayak Seguris + Amistar Opti *	1,2 l 0,8 l + 1,2 l	32 - 37 45 - 55	90	10/5,5,0 m; NW 706 k.A./20,10,5 m; NW 701; NG 331, NG 342-1
Rubric Aviator Xpro + Amistar Opti *	1,0 l 0,8 l + 1,2 l	32 - 37 45 - 55	113	5/5,5,0 m k.A./20,10,5 m; NW 706; NG 331
Rubric Ceralo ** + Amistar Opti *	1,0 l 1,0 l + 1,5 l	32 - 37 45 - 55	109	5/5,5,0 m k.A./20,15,10 m; NW 706; NG 331

* Für Fungizide mit dem Wirkstoff Chlorthalonil gilt eine Aufbrauchfrist bis zum 20. Mai 2020

** Aufbrauchfrist Ceralo 28.02.2021

Sommergerste: i.d.R. Einmalbehandlung ausreichend & wirtschaftlich, nur bei frühem Krankheitsbefall (EC 30-32) Doppelbehandlung mit ca. 80 % Aufwandmenge WG.

Legende: k.A. = keine Anwendung;

Azol = Azole; G2 = Morpholine, Piperidine, Spiroxamine; Kontakt = Kontaktwirkstoffe, SDHI = Carboxamide, Strobi = Strobilurine

Pauschalabstand zu Gewässern in BW = 5 m

NW 701 (10 m), NW 706 (20m) = bei > 2 % Hangneigung bewachsener Randstreifen von (…. m) nötig,gilt nicht bei Mulch-/Direktsaat od. wenn entspr.Auffangsysteme für abgeschwemmtes Wasser od. Boden vorhanden sind

NG 331 = max. 2000 g Chlorthalonil /ha und Jahr (entspr. 5l Amistar Opti)

NW 712, NG 342-1 = Mittel mit gleichem Wirkstoff max. 1 x /Jahr auf der gleichen Fläche einsetzen

Preis: inkl. Rabatt incl. MWSt.