

Ramtillkraut (*Guizotia abyssinica*)

Familie	Korbblütler (<i>Asteraceae</i>)
Reinsaatstärke (kg/ha)	10 ¹⁾
Kosten netto (€/kg) ²⁾	3,57
TKM (g)	2 - 4
Jugendentwicklung ³⁾	schnell
Konkurrenzstärke ³⁾	gut
Unkrautunterdrückung ³⁾	gut - mittel
Späteste Aussaat (pflanzenbauliche Empfehlung) ³⁾	Mitte August ¹⁾
Mulchaufgabe im Frühjahr ³⁾	sehr gering
Bienen	k.A.
Durchwurzelungsvermögen/Wurzelform	Büschelwurzel im obersten Bodenbereich ¹⁾
Ansprüche an Boden und Klima	trockentolerant ¹⁾
Winterhärte	friert sehr schnell ab (+ 2°C) ¹⁾ , früh abgefrorene, leicht verrottbare Biomasse ist Regenwurmfutter
Geeignete Folgefrüchte	Mais, Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln ¹⁾
Risiken/Nachteile/Krankheiten/Besonderheiten	Sklerotinia, ohne Saatgutnorm (auf sauberes Saatgut achten ¹⁾ , bei milden, wüchsigen Bedingungen ist starkes Wachstum und Blüte möglich → Aussamungspotential noch nicht geklärt!

¹⁾ Quelle: Schlathöller, M. und P.H. Petersen, P.H.: Welche Art was mitbringt. DLG-Mitteilung 6/2015 S. 54 - 57

²⁾ Entsprechen speziellen Sorten der Arten unserer Anfrage vom Juli 2015 bei einer Bestellmenge von <500 kg. Bitte fragen Sie beim Landhandel bzw. Saatgutfirmen an!

³⁾ Die Angaben können in Abhängigkeit von Sorten, Standort und Saatzeitpunkt variieren.

