

# Herbizideinsatz in Raps - Gräser, Ausfallgetreide, Problemunkräuter

09/2020

Unkraut/Ungras- besatz	Mittel	Aufwandmengen l/ha				HRAC - Code	Kosten € incl. MwSt.	Anwendung	Sonstiges / Gewässerabstand etc.
		Gerste Flughafer Afu/Wh	Weizen Roggen Triticale	Trespe Weidelgras	Quecke				
nur Ungräser/Ausfallgetreide	Fusilade Max	0,6	0,7	1,0	2,0	A / Fop	19-63	blattaktiv, Anwendung ab 3 Blattst. Getreide / Ungras; warme wüchsige Witterung fördert die Wirkung	
	Targa Super	0,75	0,75	1,25	2,0	A / Fop	14-38		
	Gram Fix	0,75	0,75	1,25	2,0	A / Fop	13-36		
	Panarex	1,0	1,25	1,25	2,0-2,25	A / Fop	21 - 48		
	Agil-S	0,6	0,7	1,0		A / Fop	20-33		
	Gallant Super	0,4	0,4	0,5		A / Fop	17-21		NG 345; Zul. in Raps nur im Herbst
Mittel zur <b>Resistenzvorbeugung</b> bei Ungräsern	Focus Ultra + Dash	1,0 + 1,0	1,0 + 1,0	1,5 + 1,5	2,0 + 2,0	A / Dim	31-61		
	Select 240 (+ Öl)	0,5 + 1,0	0,5 + 1,0	0,5 + 1,0		A / Dim	34		incl.einj. Risse; 30/15,10,5 m; Zul. in Raps nur im Herbst
	Crawler	3 kg/ha				K	42		incl. resist. Biotypen; NG 359
zusätzl. Vogelmiere (Ehrenpreis)	Kerb Flo	1,25 - 1,875 (bei Afu)				K	28-42	bodenaktiv, gegen spät auflaufende Ungräser; Anwendung ab 4 Blattst. Raps; Spätherbst bis Winter (dauerhaft < 5°C); feuchter Boden von Vorteil, auch auf gefrorenem aber schneefreiem Boden möglich	incl. einj. Risse, incl. resist. Biotypen
zusätzl. Kamille, Ehrenpreis, Trespen, Klatschmohn, Kornblume, Vogelmiere	Milestone	1,5				K	58		incl. einj. Risse, incl. resist. Biotypen
<b>Mittel gegen zweikeimblättrige Unkräuter im Nachauflauf</b>									
Kamille, Kornblume, Distelarten, Kreuzkraut, Nachtschatten, Ausfallleguminosen	Effigo	0,35				O	48		ab 2-Bl.St. Raps-Ende Okt./Frühjahr ab Veg.Beg. bis max. BBCI
Kamille, Distelarten, Klatschmohn, Kreuzkraut, Windenknoterich, Kornblume, Ausfallleguminosen,	Runway	0,2				O	31		NA Herbst/ NG 347, NG 348
Stiefmütterchen, Ehrenpreisarten, Erdrach, Raukearten, Hirtentäschel, Windenknoterich, Ackerkrummhals, Ochsenzunge	Fox	1,0 im Splitting 0,3/0,7				E	32		4- und 6-Blattst. Raps, kein Einsatz auf nassen Beständen, keine Tankmischungen; 5/0,0,0 m; NW 701
Kamille, Klette, Kornblume, Storchnabel u.a.	Korvetto	1,0				O	44		NA Frühjahr; 5/5,5,0 m

Bis auf Korvetto und Fox (und Select bei abweichendem Additiv) haben die anderen Mittel keine Abstandsauflagen zu Gewässern,

jedoch ist in Baden-Württemberg ein Pauschalabstand von 5 m (Wassergesetz) einzuhalten.

NW 701 = bei > 2 % Hangneigung zu Gewässer muss ein bewachsener Randstreifen mit 10 m Breite vorhanden sein, bei Mulch- und Direktsaat entfällt diese Auflage.

NG 345 = Auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff **Haloxifop-P (Haloxifop-R)** im folgenden Kalenderjahr

NG 347 = Auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff **Aminopyralid** in den beiden folgenden Kalenderjahren

NG 348 = Auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff **Clopyralid** in den beiden folgenden Kalenderjahren

NG 359 = Innerhalb von zwei Jahren dürfen maximal 1800 g/ha **Carbetamid** auf derselben Fläche ausgebracht werden.

NG 405 = Keine Anwendung auf drainierten Flächen; Preise Pflanzenschutzmittelkosten incl. MwSt. von 2020



Landwirtschaftsamt  
Sachgebiet Pflanzenbau  
07351-52/6711