

Herbizideinsatz in Raps - Unkrautbekämpfung (Clomazonefrei)

09/2020

Mittel/Mittelkombination	Aufwandmenge / ha	Anwendungszeitraum	Kosten €	Gewässerabstand	sonstige Auflagen	Anmerkungen / Sonstiges
Herbizide gegen Verunkrautung im Voraufbau bzw. frühen Nachaufbau						
Butisan Gold	2,0 - 2,5 l	VA - 5 (max 10 T.) n.S.	79 - 99	5/5,5,0 m NW 706, NG 346		Einsatz im Voraufbau zeigt i.d.R. höhere und breitere Wirkung (v.a. gegen Storchschnabel)
Butisan Kombi + Stomp Aqua (Butisan Aqua Pack)	2,0 - 2,5 l + 0,6l - 0,8l	VA	86	kA/kA,kA,0 m NW 706, NG 346		Bessere Wirkung bei Klatschmohn Schwäche: Stiefmütterchen, Kornblume
Fuego Top	2,0 l	VA- früher NA (Keimblattstd. Unkräuter)	83	5/5,0,0 m NW 706 NG 343, NG 346		Einsatz im VA zeigt i.d.R. bessere Wirkung (v.a. geg. Hirtentäschel u. Hellerkraut); Bodenfeuchte muss passen! Schwäche: Kornblume, Klatschmohn, Rauke-Arten, Stiefmütterchen
Tanaris + Runway (Tanaris Runway Pack)	1,5 l + 0,2 l	VA oder früher NA	94	10/5,5,0 m NW 706, NG 346	NG 405	Schwäche: Ackerhellerkraut, Rauke-Arten Zur Wirksamkeitsverbesserung kann diese Kombination auch als Spritzfolge mit den 0,2 l/ha Runway im NA gefahren werden.
Quantum + Fuego Top	1,25 l + 1,25 l	VA	93	10/5,5,0 m NW 706 NG 343, NG 346	NG 405	Schwäche: Klettenlabkraut, Klatschmohn, Stiefmütterchen
Herbizide gegen Verunkrautung im Nachaufbau						
Belkar + Synero (Belkar Power Pack)	0,5l +0,25 l	NA ab BBCH 16 der Kultur bis BBCH 18	92	20/10,5,5 m NW 706		Einsatz im Splitting (s.u.) mit breiterer Wirkung. Unbedingt Gebrauchsanleitung bzgl. Unverträglichkeiten in Tankmischungen & Spritzfolgen beachten! Keine Wachstumsregler/Fungizide in den Tankmix.
Spritzfolgen						
1. Belkar + Synero 2. Belkar (Belkar Power Pack)	0,25 l 0,25 l 0,25 l	NA ab BBCH 12 - 14 14 Tage n. erster Spritzung	92	20/10,5,5 m NW 706		Anwendung orientiert sich an Entwicklung der Kultur: bei unhomogenem Bestand mit der Anwendung warten, bis schwächste Pflanzen zwei volle Laubblätter entwickelt haben (BBCH 12); In 2. Splittinganw. Zumischung der Wachstumsregler Tilmor/Toprex/Folicur mögl.
1. Butisan Kombi 2. Runway (Runway Kombi Pack)	2,5 l 0,2 l	VA - max.5 T.n.S NAH 1. Laubbl.St. - Rosettenstadium	92	kA/kA,kA,0 m NW 706, NG 346		frühe Einsatztermine zeigen i.d. R. eine bessere Breitenwirkung; Kombination auch möglich als Einfachbehandlung im VA

NG 405 = keine Anwendung auf drainierten Flächen; NG 336 = auf derselben Fläche keine Anwendung

NG 343 = pro Jahr dürfen **max. 250 g/ha Quinmerac** ausgebracht werden

NG 346 = innerhalb von 3 Jahren dürfen **max. 1000 g/ha Metazachlor** auf der gleichen Fläche ausgebracht werden

NW 705 bzw. 706 = bei > 2 % Hangneigung bewachsener Randstreifen mit einer Breite von 5 m bzw. 20 m nötig, gilt **nicht bei Mulch- bzw. Direktsaat** oder wenn.

entspr. Auffangsysteme für abgeschwemmtes Wasser od. Boden vorhanden sind

NG 349 = auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff **Aminopyralid im folgenden** Kalenderjahr

NG 350 = auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff **Clopyralid im folgenden** Kalenderjahr

Preise Pflanzenschutzmittelkosten incl. MWSt. von 2020



Landwirtschaftsamt
Sachgebiet Pflanzenbau
07351-52/6711