

Wirksamkeit ausgewählter Fungizide und Wachstumsregler im Raps 01/2020 LRA-LWA BC Tel.: 07351/526711

Mittel	Aufwand- menge [g,l,kg / ha]	Einsatzzeit	Wirksamkeit / Zulassungsbereich					Bienen- schutz Auflage	Gewässerabstand				Randstreifen [m] bei Hangneigung > 2%	Kosten [€/ha]
			Stand- festigkeit	Phoma	Sklero- tinia	Alternaria	Schoten- festigkeit		ohne	50%	75%	90%		
Wachstumsregler / Fungizide														
Ampera	1,5	H & F	+					B4***	10	5	5	0	10	44
Caramba	1,5	H bis Blüte	+	+	+			B4***	5	5	5	0		41
Carax	0,5 - 1,4	H & F	+++	+				B4***	5	0	0	0		17 - 49
Efilor	0,7 - 1,0	H bis Blüte	+	++	+++	+	+	B4***	5	5	0	0		37 - 53
Folicur	1,0 - 1,5	H bis Blüte	+	+	+	+	+	B4***	10 ^{*/1} 5	5*/10	5*/5	0*/5	10	23 - 35
Matador ¹⁾	1,0 - 1,5	H bis Blüte	+	++	++		+	B4***	10	5	5	0	10	28 - 41
Orius	1,5	H bis Blüte	+	+	+			B4***	10	5	5	0	10	27
Tilmor	1,2	H & F	+	++				B4***	10	5	5	0	10	42
Toprex	0,5	H & F	++	+				B4***	5	5	0	0	NG 341	34
Fungizide														
Amistar Gold	1,0	H bis Blüte		+	+++			B4***	5	5	0	0	5 **	38
Cantus Gold	0,5	H bis Blüte		++	+++	++	+	B4	5	5	0	0	10 **	55
Custodia	1,0	Blüte			+++		+(+)	B4***	5	5	0	0		45
Propulse	1,0	Blüte			+++	++	+	B4***	5	0	0	0		57
Symetra	1,0	Blüte			+++	+++	+	B4	5	5	0	0	NG 342-1	49
Torero	1,0	Blüte			++	++	+	B4	5	5	0	0		35
Moddus	1,5	Frühjahr	+++					B4						95
Contans WG	2	vor der Saat			+++			B3						64

* bei weniger als 1,25 l Aufwandmenge gelten niedrigere Abstände

** nur bei Herbstanwendung

*** = Änderung der Bienenschutzauflage in Abhängigkeit des eingesetzten Insektizides

¹⁾ Für Matador gilt eine Aufbrauchfrist bis 28. Februar 2021

Legende: H = Herbst, F = Frühjahr; +++ sehr gute Wirkung, ++ gute Wirkung; + mittlere Wirkung

Pauschalabstand zu Gewässern in BW = 5 m

NG 341 = max. 80 g Paclobutrazol/ha und Kalenderjahr \triangleq max. 0,65 l/Jahr; NG 342-1 = nur 1 x /Jahr Mittel mit dem Wirkstoff Isopyrazam

Preis: inkl. Rabatt incl. MWSt.